



SITUATION DES ENFANTS ET DES FEMMES AU BENIN

2014

ENQUETE PAR GRAPPE A
INDICATEURS MULTIPLES
Présentation des résultats



PLAN DE PRESENTATION

- ❑ 1. MICS Bénin 2014: Méthodologie et organisation
- ❑ 2. MICS Bénin 2014: Contrôle et assurance de qualité
- ❑ 3. Principaux résultats

1

MICS BENIN 2014: Méthodologie et organisation

- ❑ Enquête par grappe à indicateurs multiples (MICS) est un programme international d'enquêtes auprès des ménages élaboré par l'UNICEF;
- ❑ MICS est conçu pour recueillir des indicateurs clés comparables au niveau international et utilisés pour évaluer la situation des enfants et des femmes dans les domaines de la santé, l'éducation, la protection et le VIH/ SIDA;
- ❑ MICS a permis de fournir plusieurs indicateurs des OMD (22 indicateurs des OMD sur 48);
- ❑ Spécifiquement, le Round 5 des enquêtes MICS a permis le rapportage des OMD en 2015;
- ❑ Echantillon de MICS est représentatif au niveau national et dans les 12 départements, basé sur un sondage par grappes stratifié à deux degrés;
- ❑ Base de sondage utilisée est celui du recensement de 2013.

1a

MICS BENIN 2014: Méthodologie et organisation

Les données de l'enquête MICS sont nécessaires au suivi de 11 objectifs sur les 17 des ODD et 28 cibles sur les 169:

OBJECTIFS	CIBLES
Objectif 1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde	1.2 et 1.4
Objectif 2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable	2.2
Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge	3.1; 3.2; 3.5; 3.7; 3.8 et 3.a
Objectif 4. Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie	4.2; 4.3; 4.5 et 4.6
Objectif 5. Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles	5.2; 5.3; 5.6 et 5.b
Objectif 6. Garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement gérés de façon durable	6.1 et 6.2
Objectif 7. Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable	7.1
Objectif 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous	8.6 et 8.7
Objectif 11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables	11.1 et 11.6
Objectif 16. Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous	16.2 et 16.9
Objectif 17. Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser	17.6 et 17.8

1c

MICS BENIN 2014: Méthodologie et organisation

- ❑ Réalisées en 2014 (MICS) et en 2015 (EMICoV), ces deux grandes opérations statistiques permettront de disposer de la situation de référence des indicateurs sur les ODD.

1

MICS BENIN 2014: Méthodologie et organisation

- ❑ Quatre questionnaires ont été utilisés: ménage, femme, enfant et homme.
- ❑ Echantillon de l'enquête:
 - 14 077 ménages urbains et ruraux enquêtés
 - 15 815 femmes de 15-49 ans enquêtées
 - 12 250 enfants de moins de 5 ans et
 - 4 371 hommes de 15-49 ans.

1

MICS BENIN 2014: Méthodologie et organisation

❑ MICS Bénin 2014 c'est:

27 équipes de terrain et 171 agents de terrain

33 jours de formation

90 jours de collecte sur le terrain (Juillet- Septembre 2014)

Et

L'utilisation du système CAPI pour la collecte des données;

22 spécialistes ayant assuré la formation des agents et la supervision de la collecte

2

MICS BENIN 2014: Contrôle et assurance de qualité

□ MICS Bénin 2014, c'est :

- Programme de contrôle et de cohérence installé dans l'application;
- Recrutement des enquêteurs fondé sur les expériences en matière d'enquêtes et tests de langue effectués
- Evaluation des enquêteurs sur la base de tests écrits et pratiques
- Utilisation du logiciel ENA pour la vérification des mesures anthropométriques;
- Contrôle de qualité au niveau des chef d'équipes présents sur le terrain avec les agents;
- Edition des données sur le terrain assurée par 9 éditeurs (1 éditeur pour 3 équipes).

2

MICS BENIN 2014: Contrôle et assurance de qualité

❑ MICS Bénin 2014, c'est:


- Supervision technique rapprochée (au moins 2 fois par mois) et une supervision de coordination chaque mois;
- Deux ateliers d'apurement des données au niveau national;
- Validation des données au niveau du bureau régional de Dakar et au siège de l'UNICEF à New York;

MICS BENIN 2014: QUE PEUT-ON RETENIR?

3

SURVIE DES ENFANTS

Mortalité de la petite enfance




❑ Pour chaque 1 000 enfants nés vivant, 67 (près de 7 enfants sur 100) décèdent avant d'atteindre leur premier anniversaire;

❑ Pour chaque 1 000 enfants nés vivant, 115 (près de 12 enfants sur 100) décèdent entre la naissance et leur cinquième anniversaire

3

SURVIE DES ENFANTS

Mortalité de
la petite
enfance



On note une surmortalité masculine à tous les âges de la petite enfance.

C'est au cours du premier mois de vie que cette surmortalité masculine est plus élevée.

3

SURVIE DES ENFANTS

Mortalité de la petite enfance



Mortalité infantile



Mortalité juvénile


INSAE





- ❑ Retard de croissance: 1 enfant sur 3 (34%) de moins de cinq est trop petit pour son âge;
- ❑ Sous la forme sévère, le retard de croissance touche 12% des enfants de moins de cinq ans;
- ❑ Le retard de croissance touche plus les enfants de sexe masculin (35,8%) que ceux de sexe féminin (32,4%).

Age (en mois)






- Le retard de croissance augmente avec l'âge et les enfants de 24-47 mois sont les plus affectés;

- La prévalence de l'insuffisance pondérale est de 18% dont 4,7% sous la forme sévère;
- L'émaciation touche 4,5% des enfants de moins de 5 ans.

4

SANTE ET NUTRITION DES ENFANTS

Etat nutrition



Insuffisance pondérale



Retard de croissance




Emaciation



Initiation précoce de l'allaitement

- Environ Une femme sur 2 (46,6%) met son bébé au sein moins d'**Une** heure après la naissance


**Allaitement exclusif des moins de 6 mois**

- 41% des enfants de moins de 6 mois (4 bébés sur 10) sont exclusivement nourris au sein



Un enfant sur 4 de 6-23 mois a reçu des aliments de 4 groupes ou plus durant le jour précédent

Allaitement exclusif des moins de 6 mois



La pratique de l'allaitement exclusif au sein des enfants de moins de 6 mois varie fortement selon les départements. Les niveaux les plus faibles sont constatés dans les départements du Plateau, du Mono, du Littoral, de l'Atlantique et des Collines.

Dans les départements du Couffo et de l'Ouémé, un peu plus d'un enfant sur 2 de moins de 6 mois est allaité exclusivement au sein.


Couverture vaccinale complète

- 2 enfants sur 5 (41,6%) âgés de 12-23 mois ont reçu tous les vaccins recommandés avant leur premier anniversaire

**Couverture vaccinale de la rougeole**



- Parmi les enfants de 12-23 mois, 65% ont reçu le vaccin contre la rougeole avant leur premier anniversaire.

Pourcentage d'enfants âgés 12-23 mois actuellement vaccinés contre les maladies infantiles évitables par la vaccination



8 ménages sur 10 (77%) disposent au moins d'une Moustiquaire Imprégnées d'Insecticides (MII)


- ❑ Au cours de l'enquête, environ 3 enfants de moins de cinq ans sur 4 (72,7%) ont dormi sous MII la nuit précédente
- ❑ Une femme enceinte sur deux (47%) a dormi sous MII la nuit précédente




4

SANTE ET NUTRITION DES ENFANTS


Paludisme /
Fièvre



% ménages avec au moins un MII




% femmes enceintes qui ont dormi sous MII la nuit dernière



% enfants <5 ans qui ont dormi sous MII la nuit dernière




- ❑ 10,1% des enfants de moins 5 ans ont eu dans les deux dernières semaines un épisode de diarrhée;
- ❑ 22,9% des enfants de moins 5 ans ont eu dans les deux dernières semaines un épisode de fièvre;
- ❑ Pour 44% des enfants de moins de cinq ans ayant eu la fièvre dans les 2 dernières semaines, un conseil/traitement a été recherché auprès d'une structure/agent de santé;
- ❑ Un enfant de moins de 5 ans sur 4 (25,9%) avec de la fièvre a reçu n'importe quel traitement anti-paludéen.



- ❑ 18% des femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union utilisent (ou dont le partenaire utilise) une méthode de contraception (traditionnelle ou moderne).
- ❑ Le taux de prévalence contraceptive est faible dans la Donga (6,6%), dans le Zou (11,5%) et dans l'Atacora (15,4%).

Taux de prévalence contraceptive





- Besoins non-satisfaits pour limiter ou espacer les naissances.

33,1%



- 20,8% des besoins non satisfaits pour l'espacement des naissances et 12,3% pour la limitation des naissances.






Besoins non-satisfaits par
département

Source : Données MICS


- 82,8% des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les deux dernières années ont reçu des soins prénatals dispensés par un agent qualifié et 7,3% n'ont pas reçu de soins prénatals;




- ❑ 58,7% de ces femmes ont effectués 4 visites ou plus et 11,2% ont effectué 2 visites;
- ❑ 51,4% des femmes ont effectué leur première VPN au cours du premier trimestre de la grossesse et 10,7% entre 6-7 mois de grossesse;
- ❑ 44,8% des femmes n'ayant aucun niveau d'instruction ont effectué leur première visite au premier trimestre de la grossesse contre 83,9% chez les femmes ayant le niveau secondaire 2 et supérieur.


- ❑ 77,2% des accouchements ont été assistés par un personnel qualifié;
- ❑ Les résultats des départements montrent des disparités: 42% dans le Borgou et 61% dans l'Alibori contre 94% dans l'Atlantique et 98% dans le Littoral.

Accouchement avec une assistance qualifiée





- ❑ 78% des femmes de 15-49 ans ont reçu un examen de santé dans la structure de santé ou à la maison juste après ou dans les 2 jours après l'accouchement de leur plus récente naissance vivantes des 2 dernières années;
- ❑ 4 nouveau-nés sur 5 (80%) des 2 dernières années ont reçu un examen post-natal




- ❑ Près de 9 naissances sur 10 (87%) ont eu lieu dans une structure de santé;
- ❑ Près de 9 femmes sur 10 (87%) de 15-49 ans ayant accouché dans une structure de santé ont reçu des examens de santé post-natals de la mère;
- ❑ Mortalité maternelle reste encore élevée: 347 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes.

6

EAU ET ASSAINISSEMENT

Accès à l'eau et à l'assainissement




- Environ 3 personnes sur 4 utilisent des sources d'eau de boisson améliorées;
- 91,7% de la population n'ayant pas accès à une source potable n'utilisent aucune méthode de traitement.
- 13% des personnes utilisent des toilettes améliorées non partagées.

6


EAU ET ASSAINISSEMENT

Accès à l'eau et à l'assainissement




- La proportion de la population utilisant une source améliorée d'eau de boisson est faible dans les départements de la Donga (50,1%) et de l'Alibori (53,9%);


- ❑ Taux net d'admission au primaire est de 52,3%;




- ❑ 9 enfants sur 10 (87,4%) commençant la 1^{ère} année d'étude du primaire atteignent la dernière année de ce cycle.

- Taux net de scolarisation au primaire (74,9%) et au secondaire (44,0%)





Taux net de scolarisation au primaire



Taux net de scolarisation au secondaire



4 naissances sur 5
(84,8%) sont
enregistrées à l'Etat
civil.



91,1% des enfants de 1-14 ans ont subi une agression psychologique ou un châtiment corporel durant le mois précédent l'enquête dans le ménage.

Châtiment physique
Autre (52%) et Sévère (22,5%)




Aggression psychologique
(87%)





Discipline non violente (4%)

44,1% des répondants (Mère 45,5% et Père -41,9%) au module pensent qu'un enfant à besoin d'être physiquement puni.




Mariages précoces



Pourcentage d'enfants de 5-11 ans impliqués
dans le travail des enfants


52,5% des enfants de 5-11 ans sont impliqués dans le travail des enfants. Un enfant sur deux qui fréquente est impliqué dans le travail des enfants.

Enfants de 5-17 ans travaillant dans des conditions
dangereuses


40% des enfants impliqués dans le travail des enfants travaillent dans des conditions dangereuses avec des niveaux élevés dans le Couffo (79%), l'Alibori (53%) et le Plateau (51%).




Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant subi n'importe quelle forme de MGF/E



Seulement
0,2% des filles
de 0-14 ans ont
subi n'importe
quelle forme de
MFG



Mais les attitudes quant à la
poursuite de la pratique de la MFG
montrent que



- ❑ Seulement 13% des enfants de 36-59 mois suivent un programme d'instruction préscolaire;
- ❑  5,2% des enfants 36-59 mois dont le père biologique s'est engagé dans une ou plusieurs activités de préparation scolaire ou de promotion à l'apprentissage;
- ❑ 13,3% des enfants de 36-59 mois pour les mères engagées.

31,3% des jeunes hommes de 15-24 ans ont une connaissance de la prévention du VIH




21,6% des jeunes femmes de 15-24 ans ont une connaissance de la prévention du VIH



Utilisation du condom par les 15-24 ans durant le dernier Rapport sexuel avec un partenaire autre que le conjoint ou le partenaire cohabitant au cours des 12 derniers mois

12,2% jeunes femmes de 15-24 ans sexuellement actives qui ont fait un test de VIH dans les 12 derniers mois et en connaissent le résultat contre 6,8% pour les jeunes hommes.

11

ACCES AUX MASS MEDIA ET
UTILISATION DES TICAccès aux
mass média

73% des hommes de 15-49 ans sont exposés à n'importe quel média au moins une fois par semaine contre 54% chez les femmes.

MERCI DE VOTRE
ATTENTION